

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 6 al 12 de mayo de 1963 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 6 al 12 de mayo de 1963 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el sábado 11 a las 00:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -21 nT el sábado 11 a las 01:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-21 nT mín.	11-may 01:00	-1 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	11-may 00:00	2.43	7/7
ap	32 nT máx.	11-may 00:00	11 nT	7/7
AU	sin dato	—	—	0/7
AL	sin dato	—	—	0/7
Rayos X	sin dato	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 06-may	3.70	22	-12	—	—	—
Mar 07-may	2.70	12	-1	—	—	—
Mié 08-may	3.70	22	-4	—	—	—
Jue 09-may	3.70	22	-11	—	—	—
Vie 10-may	3.30	18	-16	—	—	—
Sáb 11-may	4.30	32	-21	—	—	—
Dom 12-may	2.70	12	-10	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2