

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 8 al 14 de julio de 1963 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 8 al 14 de julio de 1963 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el martes 9 a las 00:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -14 nT el martes 9 a las 21:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-14 nT mín.	09-jul 21:00	6 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	09-jul 00:00	1.84	7/7
ap	27 nT máx.	09-jul 00:00	8 nT	7/7
AU	sin dato	—	—	0/7
AL	sin dato	—	—	0/7
Rayos X	sin dato	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 08-jul	3.70	22	-4	—	—	—
Mar 09-jul	4.00	27	-14	—	—	—
Mié 10-jul	3.00	15	-10	—	—	—
Jue 11-jul	2.30	9	-4	—	—	—
Vie 12-jul	1.70	6	-3	—	—	—
Sáb 13-jul	2.00	7	2	—	—	—
Dom 14-jul	2.30	9	12	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2