

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 11 al 17 de octubre de 1965 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 11 al 17 de octubre de 1965 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.00 (3o) el miércoles 13 a las 18:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -8 nT el jueves 14 a las 03:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-8 nT mín.	14-oct 03:00	7 nT	7/7
Kp	3.00 (3o) máx.	13-oct 18:00	0.97	7/7
ap	15 nT máx.	13-oct 18:00	4 nT	7/7
AU	sin dato	—	—	0/7
AL	sin dato	—	—	0/7
Rayos X	sin dato	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 11-oct	1.00	4	2	—	—	—
Mar 12-oct	2.30	9	2	—	—	—
Mié 13-oct	3.00	15	-5	—	—	—
Jue 14-oct	2.70	12	-8	—	—	—
Vie 15-oct	0.70	3	-2	—	—	—
Sáb 16-oct	0.70	3	5	—	—	—
Dom 17-oct	1.30	5	8	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2