Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 25 al 31 de octubre de 1965 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 25 al 31 de octubre de 1965 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el martes 26 a las 00:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre −30 nT, con un mínimo de −18 nT el lunes 25 a las 03:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	−18 nT mín.	25-oct 03:00	1 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	26-oct 00:00	1.86	7/7
ap	27 nT máx.	26-oct 00:00	8 nT	7/7
AU	*sin dato*	—	—	*0/7*
AL	*sin dato*	—	—	*0/7*
Rayos X	*sin dato*	—	—	*0/7*

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 25-oct	3.30	18	−18	—	—	—
Mar 26-oct	4.00	27	−4	—	—	—
Mié 27-oct	2.70	12	3	—	—	—
Jue 28-oct	4.00	27	−6	—	—	—
Vie 29-oct	2.70	12	−7	—	—	—
Sáb 30-oct	3.00	15	−10	—	—	—
Dom 31-oct	2.30	9	−11	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ −50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)

Rayos X solares 1–8 Å (promedio horario, W/m²)

Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.