

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 11 al 17 de abril de 1966 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 11 al 17 de abril de 1966 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el miércoles 13 a las 12:00 UTC. El índice Dst llegó a -47 nT el miércoles 13 a las 19:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -577 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-47 nT mín.	13-abr 19:00	-1 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	13-abr 12:00	1.25	7/7
ap	27 nT máx.	13-abr 12:00	6 nT	7/7
AU	350 nT máx.	13-abr 18:00	66 nT	7/7
AL	-577 nT mín.	13-abr 18:00	-78 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 11-abr	1.00	4	1	41	-43	—
Mar 12-abr	1.70	6	3	73	-75	—
Mié 13-abr	4.00	27	-47	350	-577	—
Jue 14-abr	2.70	12	-33	246	-229	—
Vie 15-abr	3.00	15	-11	117	-314	—
Sáb 16-abr	1.30	5	-5	66	-69	—
Dom 17-abr	1.70	6	0	114	-143	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

