

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1966 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1966 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.30 (3+) el domingo 1 a las 03:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -20 nT el domingo 1 a las 03:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -488 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-20 nT mín.	01-may 03:00	2 nT	7/7
Kp	3.30 (3+) máx.	01-may 03:00	1.22	7/7
ap	18 nT máx.	01-may 03:00	5 nT	7/7
AU	268 nT máx.	30-abr 16:00	58 nT	7/7
AL	-488 nT mín.	30-abr 17:00	-85 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 25-abr	1.00	4	-2	50	-92	—
Mar 26-abr	1.00	4	0	38	-94	—
Mié 27-abr	0.70	3	7	42	-46	—
Jue 28-abr	1.70	6	3	108	-229	—
Vie 29-abr	3.00	15	-8	179	-280	—
Sáb 30-abr	3.00	15	-19	268	-488	—
Dom 01-may	3.30	18	-20	157	-259	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2