

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 13 al 19 de junio de 1966 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 13 al 19 de junio de 1966 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.00 (3o) el miércoles 15 a las 21:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -11 nT el martes 14 a las 21:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -263 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-11 nT mín.	14-jun 21:00	5 nT	7/7
Kp	3.00 (3o) máx.	15-jun 21:00	1.14	7/7
ap	15 nT máx.	15-jun 21:00	5 nT	7/7
AU	301 nT máx.	15-jun 23:00	73 nT	7/7
AL	-263 nT mín.	14-jun 08:00	-63 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 13-jun	2.00	7	-6	206	-192	—
Mar 14-jun	1.70	6	-11	272	-263	—
Mié 15-jun	3.00	15	-9	301	-238	—
Jue 16-jun	3.00	15	-5	198	-205	—
Vie 17-jun	2.00	7	-3	97	-121	—
Sáb 18-jun	1.30	5	-1	65	-54	—
Dom 19-jun	2.70	12	0	154	-102	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2