

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 11 al 17 de julio de 1966 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 11 al 17 de julio de 1966 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el martes 12 a las 03:00 UTC. El índice Dst llegó a -39 nT el martes 12 a las 08:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -463 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-39 nT mín.	12-jul 08:00	-6 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	12-jul 03:00	1.64	7/7
ap	32 nT máx.	12-jul 03:00	8 nT	7/7
AU	387 nT máx.	12-jul 09:00	68 nT	7/7
AL	-463 nT mín.	12-jul 10:00	-92 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 11-jul	3.30	18	-28	169	-417	—
Mar 12-jul	4.30	32	-39	387	-463	—
Mié 13-jul	1.00	4	-21	54	-53	—
Jue 14-jul	1.70	6	-9	64	-133	—
Vie 15-jul	4.30	32	0	140	-170	—
Sáb 16-jul	2.70	12	-8	153	-262	—
Dom 17-jul	3.30	18	-13	240	-449	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

