

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 14 al 20 de noviembre de 1966 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 14 al 20 de noviembre de 1966 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el viernes 18 a las 15:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -22 nT el sábado 19 a las 10:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -363 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-22 nT mín.	19-nov 10:00	-4 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	18-nov 15:00	1.62	7/7
ap	27 nT máx.	18-nov 15:00	8 nT	7/7
AU	225 nT máx.	18-nov 18:00	50 nT	7/7
AL	-363 nT mín.	18-nov 22:00	-81 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 14-nov	1.00	4	-3	53	-40	—
Mar 15-nov	1.70	6	-7	79	-186	—
Mié 16-nov	2.00	7	-20	171	-244	—
Jue 17-nov	3.30	18	-19	148	-213	—
Vie 18-nov	4.00	27	-19	225	-363	—
Sáb 19-nov	3.30	18	-22	143	-325	—
Dom 20-nov	3.30	18	-21	114	-297	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2