

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 8 al 14 de enero de 1968 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 8 al 14 de enero de 1968 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.30 (3+) el jueves 11 a las 12:00 UTC. El índice Dst llegó a -36 nT el domingo 14 a las 05:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -423 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-36 nT mín.	14-ene 05:00	-15 nT	7/7
Kp	3.30 (3+) máx.	11-ene 12:00	1.82	7/7
ap	18 nT máx.	11-ene 12:00	8 nT	7/7
AU	272 nT máx.	12-ene 19:00	75 nT	7/7
AL	-423 nT mín.	14-ene 19:00	-82 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 08-ene	2.70	12	-20	75	-247	—
Mar 09-ene	1.70	6	-14	54	-193	—
Mié 10-ene	2.00	7	-18	131	-239	—
Jue 11-ene	3.30	18	-12	244	-314	—
Vie 12-ene	3.30	18	-29	272	-386	—
Sáb 13-ene	3.00	15	-35	144	-309	—
Dom 14-ene	3.30	18	-36	163	-423	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

