

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 15 al 21 de enero de 1968 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 15 al 21 de enero de 1968 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el martes 16 a las 18:00 UTC. El índice Dst llegó a -37 nT el lunes 15 a las 22:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -556 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-37 nT mín.	15-ene 22:00	-16 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	16-ene 18:00	2.44	7/7
ap	27 nT máx.	16-ene 18:00	12 nT	7/7
AU	280 nT máx.	16-ene 19:00	82 nT	7/7
AL	-556 nT mín.	19-ene 16:00	-129 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 15-ene	3.70	22	-37	213	-312	—
Mar 16-ene	4.00	27	-34	280	-467	—
Mié 17-ene	4.00	27	-31	118	-360	—
Jue 18-ene	4.00	27	-26	145	-330	—
Vie 19-ene	4.00	27	-19	198	-556	—
Sáb 20-ene	4.00	27	-25	193	-427	—
Dom 21-ene	2.70	12	-29	101	-308	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

