

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 22 al 28 de enero de 1968 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 22 al 28 de enero de 1968 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el viernes 26 a las 15:00 UTC. El índice Dst llegó a −36 nT el domingo 28 a las 02:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó −741 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	−36 nT mín.	28-ene 02:00	−9 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	26-ene 15:00	2.14	7/7
ap	32 nT máx.	26-ene 15:00	10 nT	7/7
AU	235 nT máx.	26-ene 16:00	54 nT	7/7
AL	−741 nT mín.	26-ene 15:00	−115 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 22-ene	3.00	15	−9	104	−519	—
Mar 23-ene	3.30	18	−11	113	−432	—
Mié 24-ene	3.00	15	−11	92	−469	—
Jue 25-ene	2.00	7	−14	68	−202	—
Vie 26-ene	4.30	32	−13	235	−741	—
Sáb 27-ene	3.70	22	−22	111	−467	—
Dom 28-ene	4.30	32	−36	196	−392	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ −50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2