

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 22 al 28 de julio de 1968 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 22 al 28 de julio de 1968 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el lunes 22 a las 12:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -25 nT el lunes 22 a las 10:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -452 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-25 nT mín.	22-jul 10:00	-5 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	22-jul 12:00	2.18	7/7
ap	32 nT máx.	22-jul 12:00	11 nT	7/7
AU	349 nT máx.	22-jul 10:00	103 nT	7/7
AL	-452 nT mín.	22-jul 09:00	-113 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 22-jul	4.30	32	-25	349	-452	—
Mar 23-jul	3.70	22	-24	287	-326	—
Mié 24-jul	1.00	4	-15	87	-152	—
Jue 25-jul	3.00	15	-10	115	-162	—
Vie 26-jul	4.00	27	-7	316	-325	—
Sáb 27-jul	3.30	18	-17	184	-355	—
Dom 28-jul	3.00	15	-6	176	-243	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2