

Resumen

Durante la semana del 2 al 8 de junio de 1969 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.70 (4-) el domingo 8 a las 03:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -13 nT el martes 3 a las 23:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -288 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-13 nT mín.	03-jun 23:00	2 nT	7/7
Kp	3.70 (4-) máx.	08-jun 03:00	1.58	7/7
ap	22 nT máx.	08-jun 03:00	7 nT	7/7
AU	405 nT máx.	08-jun 21:00	121 nT	7/7
AL	-288 nT mín.	08-jun 17:00	-100 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 02-jun	2.70	12	-11	183	-240	—
Mar 03-jun	2.30	9	-13	256	-261	—
Mié 04-jun	2.00	7	-13	188	-214	—
Jue 05-jun	2.70	12	-1	183	-260	—
Vie 06-jun	2.00	7	-3	219	-192	—
Sáb 07-jun	3.30	18	-6	269	-277	—
Dom 08-jun	3.70	22	-7	405	-288	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2