

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 16 al 22 de junio de 1975 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 16 al 22 de junio de 1975 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.70 (4-) el lunes 16 a las 09:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -15 nT el miércoles 18 a las 04:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -505 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-15 nT mín.	18-jun 04:00	-4 nT	7/7
Kp	3.70 (4-) máx.	16-jun 09:00	2.28	7/7
ap	22 nT máx.	16-jun 09:00	10 nT	7/7
AU	322 nT máx.	16-jun 10:00	99 nT	7/7
AL	-505 nT mín.	16-jun 10:00	-153 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 16-jun	3.70	22	-13	322	-505	—
Mar 17-jun	3.70	22	-10	202	-351	—
Mié 18-jun	3.30	18	-15	182	-404	—
Jue 19-jun	3.00	15	-10	167	-399	—
Vie 20-jun	2.70	12	-8	135	-149	—
Sáb 21-jun	3.00	15	-12	162	-384	—
Dom 22-jun	2.00	7	-10	124	-256	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

