

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 11 al 17 de junio de 1979 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 11 al 17 de junio de 1979 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el sábado 16 a las 12:00 UTC. El índice Dst llegó a -30 nT el sábado 16 a las 23:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -572 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-30 nT mín.	16-jun 23:00	-5 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	16-jun 12:00	2.27	7/7
ap	27 nT máx.	16-jun 12:00	10 nT	7/7
AU	411 nT máx.	17-jun 15:00	124 nT	7/7
AL	-572 nT mín.	17-jun 15:00	-141 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 11-jun	3.00	15	-15	225	-287	—
Mar 12-jun	3.00	15	-13	204	-253	—
Mié 13-jun	3.00	15	-7	214	-270	—
Jue 14-jun	2.30	9	-11	214	-206	—
Vie 15-jun	3.00	15	-4	246	-301	—
Sáb 16-jun	4.00	27	-30	309	-443	—
Dom 17-jun	4.00	27	-30	411	-572	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

