

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 11 al 17 de mayo de 1987 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 11 al 17 de mayo de 1987 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.00 (3o) el miércoles 13 a las 21:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -6 nT el jueves 14 a las 15:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -360 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-6 nT mín.	14-may 15:00	5 nT	7/7
Kp	3.00 (3o) máx.	13-may 21:00	1.26	7/7
ap	15 nT máx.	13-may 21:00	5 nT	7/7
AU	205 nT máx.	14-may 13:00	44 nT	7/7
AL	-360 nT mín.	14-may 01:00	-56 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 11-may	2.70	12	-5	116	-241	—
Mar 12-may	1.30	5	0	38	-43	—
Mié 13-may	3.00	15	4	143	-230	—
Jue 14-may	3.00	15	-6	205	-360	—
Vie 15-may	1.70	6	-6	98	-203	—
Sáb 16-may	1.70	6	-3	92	-124	—
Dom 17-may	1.30	5	3	42	-53	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2