Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 19 al 25 de junio de 1989 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 19 al 25 de junio de 1989 se registró una tormenta geomagnética menor (G1): el índice Kp alcanzó 5.30 (5+) el martes 20 a las 18:00 UTC. El índice Dst llegó a −38 nT el martes 20 a las 13:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	−38 nT mín.	20-jun 13:00	−8 nT	7/7
Kp	5.30 (5+, G1) máx.	20-jun 18:00	1.95	7/7
ap	56 nT máx.	20-jun 18:00	10 nT	7/7
AU	*sin dato*	—	—	*0/7*
AL	*sin dato*	—	—	*0/7*
Rayos X	*sin dato*	—	—	*0/7*


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 19-jun	3.30	18	−30	—	—	—
Mar 20-jun	**5.30**	56	−38	—	—	—
Mié 21-jun	1.70	6	−37	—	—	—
Jue 22-jun	2.00	7	−12	—	—	—
Vie 23-jun	2.00	7	−8	—	—	—
Sáb 24-jun	4.00	27	−12	—	—	—
Dom 25-jun	2.30	9	−12	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ −50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1–8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.