Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 17 al 23 de julio de 1989 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 17 al 23 de julio de 1989 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el martes 18 a las 03:00 UTC. El índice Dst llegó a −31 nT el martes 18 a las 20:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	−31 nT mín.	18-jul 20:00	2 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	18-jul 03:00	1.85	7/7
ap	32 nT máx.	18-jul 03:00	8 nT	7/7
AU	*sin dato*	—	—	*0/7*
AL	*sin dato*	—	—	*0/7*
Rayos X	*sin dato*	—	—	*0/7*


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 17-jul	3.30	18	−10	—	—	—
Mar 18-jul	4.30	32	−31	—	—	—
Mié 19-jul	1.70	6	−26	—	—	—
Jue 20-jul	2.00	7	−3	—	—	—
Vie 21-jul	2.00	7	−6	—	—	—
Sáb 22-jul	2.70	12	−1	—	—	—
Dom 23-jul	3.70	22	1	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ −50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1–8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.