

Resumen

Durante la semana del 6 al 12 de julio de 1992 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.70 (4-) el domingo 12 a las 12:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -14 nT el domingo 12 a las 23:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -346 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-14 nT mín.	12-jul 23:00	9 nT	7/7
Kp	3.70 (4-) máx.	12-jul 12:00	1.43	7/7
ap	22 nT máx.	12-jul 12:00	6 nT	7/7
AU	334 nT máx.	12-jul 09:00	70 nT	7/7
AL	-346 nT mín.	12-jul 12:00	-64 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 06-jul	2.00	7	-5	154	-173	—
Mar 07-jul	1.30	5	-2	63	-94	—
Mié 08-jul	2.30	9	9	116	-131	—
Jue 09-jul	1.30	5	5	132	-178	—
Vie 10-jul	2.70	12	2	182	-215	—
Sáb 11-jul	1.30	5	6	126	-131	—
Dom 12-jul	3.70	22	-14	334	-346	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1-8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.