

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 1 al 7 de abril de 1996 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 1 al 7 de abril de 1996 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el jueves 4 a las 12:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -28 nT el jueves 4 a las 15:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -648 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-28 nT mín.	04-abr 15:00	-7 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	04-abr 12:00	1.38	7/7
ap	27 nT máx.	04-abr 12:00	6 nT	7/7
AU	223 nT máx.	04-abr 14:00	44 nT	7/7
AL	-648 nT mín.	04-abr 14:00	-72 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 01-abr	3.00	15	-20	107	-264	—
Mar 02-abr	2.30	9	-13	76	-203	—
Mié 03-abr	3.00	15	-22	165	-219	—
Jue 04-abr	4.00	27	-28	223	-648	—
Vie 05-abr	3.00	15	-18	49	-209	—
Sáb 06-abr	1.30	5	-10	46	-119	—
Dom 07-abr	0.70	3	-7	55	-169	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

