

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 13 al 19 de marzo de 2000 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 13 al 19 de marzo de 2000 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.00 (3o) el sábado 18 a las 18:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -26 nT el lunes 13 a las 04:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -230 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-26 nT mín.	13-mar 04:00	1 nT	7/7
Kp	3.00 (3o) máx.	18-mar 18:00	1.07	7/7
ap	15 nT máx.	18-mar 18:00	4 nT	7/7
AU	191 nT máx.	19-mar 08:00	47 nT	7/7
AL	-230 nT mín.	19-mar 07:00	-50 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 13-mar	2.70	12	-26	129	-195	—
Mar 14-mar	2.00	7	-19	153	-219	—
Mié 15-mar	0.70	3	-17	80	-98	—
Jue 16-mar	1.00	4	1	28	-28	—
Vie 17-mar	2.00	7	1	111	-129	—
Sáb 18-mar	3.00	15	-3	98	-208	—
Dom 19-mar	3.00	15	-8	191	-230	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2