

# Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2014 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

## Resumen

Durante la semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2014 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.30 (3+) el viernes 1 a las 21:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre  $-30$  nT, con un mínimo de  $-18$  nT el sábado 2 a las 14:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En el Sol, el flujo de rayos X alcanzó clase M1.6 el viernes 1 a las 18:00 UTC, suficiente para un apagón de radio R1 en el lado diurno de la Tierra. En la zona auroral, el índice AL alcanzó  $-397$  nT (actividad auroral baja).

## La semana en resumen

| Índice         | Extremo semanal                                | Fecha/hora (UTC) | Promedio semanal                   | Días con dato |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dst</b>     | $-18$ nT mín.                                  | 02-ago 14:00     | 1 nT                               | 7/7           |
| <b>Kp</b>      | 3.30 (3+) máx.                                 | 01-ago 21:00     | 1.47                               | 7/7           |
| <b>ap</b>      | 18 nT máx.                                     | 01-ago 21:00     | 6 nT                               | 7/7           |
| <b>AU</b>      | 301 nT máx.                                    | 02-ago 10:00     | 68 nT                              | 7/7           |
| <b>AL</b>      | $-397$ nT mín.                                 | 28-jul 16:00     | $-71$ nT                           | 7/7           |
| <b>Rayos X</b> | $1.57\text{e-}05$ W/m <sup>2</sup> (M1.6) máx. | 01-ago 18:00     | $1.62\text{e-}06$ W/m <sup>2</sup> | 7/7           |


## Detalle por día

| Día               | Kp máx. | ap máx. | Dst mín. | AU máx. | AL mín. | Rayos X máx. |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------|
| <b>Lun 28-jul</b> | 3.00    | 15      | $-13$    | 193     | $-397$  | C2.2         |
| <b>Mar 29-jul</b> | 1.30    | 5       | $-14$    | 55      | $-107$  | C2.1         |
| <b>Mié 30-jul</b> | 2.30    | 9       | $-6$     | 159     | $-141$  | C7.6         |
| <b>Jue 31-jul</b> | 2.00    | 7       | $-1$     | 96      | $-186$  | <b>M1.1</b>  |
| <b>Vie 01-ago</b> | 3.30    | 18      | $-3$     | 276     | $-281$  | <b>M1.6</b>  |
| <b>Sáb 02-ago</b> | 3.30    | 18      | $-18$    | 301     | $-310$  | C2.2         |
| <b>Dom 03-ago</b> | 3.00    | 15      | $-10$    | 162     | $-318$  | C2.0         |

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst  $\leq -50$  nT o rayos X clase M o X.

## Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1-8 Å (promedio horario, W/m<sup>2</sup>)



## Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.