

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 21 al 27 de marzo de 2016 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 21 al 27 de marzo de 2016 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.70 (4-) el miércoles 23 a las 06:00 UTC. El índice Dst llegó a -34 nT el lunes 21 a las 00:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En el Sol, el máximo del flujo de rayos X (promedio horario) fue de clase C7.1 el miércoles 23 a las 17:00 UTC, sin fulguraciones de clase M o X. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -332 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-34 nT mín.	21-mar 00:00	-3 nT	7/7
Kp	3.70 (4-) máx.	23-mar 06:00	1.54	7/7
ap	22 nT máx.	23-mar 06:00	6 nT	7/7
AU	164 nT máx.	23-mar 06:00	43 nT	7/7
AL	-332 nT mín.	27-mar 18:00	-56 nT	7/7
Rayos X	7.13e-06 W/m ² (C7.1) máx.	23-mar 17:00	2.21e-07 W/m ²	7/7


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 21-mar	2.30	9	-34	105	-207	B1.8
Mar 22-mar	2.30	9	-12	130	-184	B3.0
Mié 23-mar	3.70	22	-15	164	-310	C7.1
Jue 24-mar	2.70	12	-15	72	-227	C5.0
Vie 25-mar	3.00	15	-24	131	-320	B1.5
Sáb 26-mar	0.70	3	-4	36	-71	B1.5
Dom 27-mar	3.30	18	-6	138	-332	B1.7

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1-8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1-8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.